

Ostale informacije

(molimo Vas da ih popunite)

Ime pacijenta: _____

Ime lekara: _____

Broj telefona lekara: _____

Prijavljivanje sumnji na neželjena dejstva

Ako Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo recite to svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koja neželjena dejstva koja nijesu navedena u ovom uputstvu. Neželjena dejstva možete prijavljivati direktno kod zdravstvenih radnika, čime ćete pomoći u dobijanju više informacija o bezbjednosti ovog lijeka.

Nosilac dozvole: Glosarij d.o.o.
Vojislavljevića 76, Podgorica, Crna Gora



Kartica sa
upozorenjima
za pacijenta



Ova kartica sadrži važne bezbednosne informacije, kojih treba da budete svesni pre nego što dobijete lek Enbrel, kao i tokom terapije lekom Enbrel. Ako ne razumete ove informacije, obratite se Vašem lekaru za dodatna pojašnjenja.

- Pokažite ovu karticu svakom lekaru koji je uključen u Vaše lečenje.
- Pogledajte Uputstvo za lek Enbrel za više informacija.
- Nosite ovu karticu sa sobom još 2 meseca nakon poslednje doze leka Enbrel, jer se neželjeni efekti mogu ispoljiti nakon što primite poslednju dozu leka Enbrel.

Važno je da Vi i Vaš lekar zabeležite zaštićeni naziv i broj serije primenjenog leka.

Infekcije

Lek Enbrel može povećati rizik da dobijete infekcije, koje mogu biti ozbiljne.

- Ne smete da koristite Enbrel ako imate infekciju. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru.
- Ako dobijete simptome koji ukazuju na infekciju, kao što su temperatura, uporni kašalj, gubitak telesne mase, ili gubitak energije, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Treba da budete ispitani na tuberkulozu (TB). Zamolite Vašeg lekara da na ovu karticu zabeleži datum i rezultate Vašeg poslednjeg testiranja na TB:

Test: _____

Datum: _____

Rezultati: _____

Test: _____

Datum: _____

Rezultati: _____

- Zamolite Vašeg lekara da zabeleži Vaše druge lekove koje mogu povećati Vaš rizik od infekcija

Kongestivna srčana insuficijencija

- Ako dobijete simptome koji ukazuju na kongestivnu srčanu insuficijenciju ili pogoršanje postojeće kongestivne srčane insuficijencije, kao što su skraćeni dah, oticanje zglobova, uporni kašalj ili umor, odmah potražite medicinsku pomoć.