

Kartica za pacijente koji uzimaju tablete Methotrexat Ebewe za liječenje artritisa ili psorijaze

AKO KORISTITE METOTREKSAT ZA LIJEČENJE ARTRITISA ILI PSORIJAZE, METOTREKSAT TREBA DA UZIMATE SAMO JEDNOM NEDELJNO

Ovde napišite pun naziv dana u nedelji kada uzimate lijek: _____

Nemojte uzimati više od propisane doze.

Predoziranje može dovesti do ozbiljnih neželjenih dejstava i može biti smrtonosno. Simptomi predoziranja su npr. bol u grlu, povišena temperatura, ulceracije (ranice) u ustima, proliv, povraćanje, osip po koži, krvarenje ili neuobičajena slabost. Ukoliko mislite da ste uzeli više od propisane doze, odmah se obratite ljekaru.

Pokažite ovu karticu svakom zdravstvenom radniku koji učestvuje u Vašem liječenju da biste ga upozorili na doziranje metotreksata JEDNOM NEDELJNO za liječenje artritisa ili psorijaze (npr. po prijemu u bolnicu).

Za dodatne informacije, molimo Vas pročitajte Uputstvo za lijek koje se nalazi u pakovanju.

- **MTX PtAlertCard MNE/01 11/20**