

**UZIMAM
antikoagulantnu
terapiju lekom
Rivaroksaban SK
(rivaroksaban)**

Ime i prezime
pacijenta

Adresa

Datum rođenja

Telesna masa

Drugi lekovi/stanja

**U hitnom slučaju
obavestite lekara:**

Ime i prezime lekara

Broj telefona lekara

Faksimil lekara

*Lični podaci pacijenata nisu dostupni kompaniji
Inpharm Co d.o.o. Podgorica*

Takođe obavestite:

Ime i prezime

Broj telefona

Srodstvo

**Informacija za
zdravstvene radnike:**

INR vrednosti
ne treba da se koriste jer nisu
pouzdan pokazatelj
antikoagulantne aktivnosti
leka Rivaroksaban SK.

**Kartica sa
upozorenjima
za pacijenta**

Rivaroksaban SK 10 mg
Rivaroksaban SK 15 mg
Rivaroksaban SK 20 mg
(rivaroksaban) ▼

▼ Ovaj lek je pod
dodatnim praćenjem.
Time se omogućava brzo
otkrivanje novih bezbednosnih
informacija. Vi u tome možete
da pomognete prijavljivanjem
bilo koje neželjene reakcije
koja se kod Vas javi.

Šta treba da znam o leku Rivaroksaban SK?

- Rivaroksaban SK razređuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Rivaroksaban SK morate uzimati tačno onako kako Vam je propisao lekar. Da bi se obezbedila optimalna zaštita od krvnih ugrušaka, **nikad ne preskačite dozu leka.**
- Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka Rivaroksaban SK, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim lekarom, pošto se može povećati Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavestite svog lekara o svakom drugom leku koji trenutno uzimate, koji ste do

nedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek Rivaroksaban SK.

- Obavestite svog lekara o tome da uzimate Rivaroksaban SK pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savet svog lekara?

Kada uzimate lek koji razređuje krv, kao što je Rivaroksaban SK, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo. Nemojte počinjati sa uzimanjem leka ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o

tome ne porazgovarate sa svojim lekarom.

Odmah kažite svom zdravstvenom radniku ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su:

- Bol
- Otok ili nelagodnost
- Glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- Neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu da krvare
- Menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično
- Krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica
- Iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe

Kako da uzimam lek Rivaroksaban SK?

Da bi se obezbedila optimalna zaštita:

- Rivaroksaban SK 10 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
- Rivaroksaban SK 15 mg se mora uzimati sa hranom
- Rivaroksaban SK 20 mg se mora uzimati sa hranom

Ovu karticu stalno imajte kod sebe.

Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja ili bilo kakve intervencije.