

Šta treba da znam o leku Xarelto?

- ◆ Xarelto razređuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka
- ◆ Xarelto morate uzimati tačno onako kako Vam je propisao lekar. Da bi se obezbedila optimalna zaštita od krvnih ugrušaka, **nikad ne preskačite dozu.**
- ◆ Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka Xarelto, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim lekarom, pošto se može povećati Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

- ◆ Obavestite svog lekara o svakom drugom leku koji trenutno uzimate, koji ste do nedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek Xarelto.
- ◆ Obavestite svog lekara o tome da uzimate Xarelto pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savet svog lekara?

Kada uzimate lek koji razređuje krv, kao što je Xarelto, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo.

Nemojte počinjati sa uzimanjem leka ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o tome ne porazgovarate sa svojim lekarom.

Odmah kažite svom zdravstvenom radniku ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su sledeći:

- ◆ Bol
- ◆ Otok ili nelagodnost
- ◆ Glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- ◆ Neuobičajena pojava modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja iz desni, krvarenja iz posekotina kojima treba mnogo vremena da prestanu
- ◆ Menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično

- ◆ Krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica
- ◆ Iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe

Kako da uzimam lek Xarelto?

- ◆ Da bi se obezbedila optimalna zaštita:
 - Xarelto 2.5 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
 - Xarelto 10 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
 - Xarelto 15 mg se mora uzimati sa hranom
 - Xarelto 20 mg se mora uzimati sa hranom

88346416

RS

Kartica sa upozorenjima za pacijenta



Xarelto® 2,5 mg

Xarelto® 10 mg

Xarelto® 15 mg

Xarelto® 20 mg

Odaberite propisanu dozu

- ◆ Ovu karticu stalno imajte kod sebe
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja ili bilo kakve intervencije

Primam antikoagulantnu terapiju lekom Xarelto (rivaroksaban)

Ime	Drugi lekovi / stanja
Adresa	
Datum rođenja:	Težina

Podaci o pacijentima (lični podaci pacijenata) nisu dostupni kompaniji Bayer d.o.o. Beograd

U hitnom slučaju obavestite:

Ime lekara

Telefon lekara

Pečat lekara

Takođe obavestite:

Ime

Telefon

Srodstvo

Informacija za zdravstvene radnike:

- ◆ INR vrednosti ne treba da se koriste jer nisu pouzdan pokazatelj antikoagulantne aktivnosti leka Xarelto

