

# KARTICA S UPOZORENJI MA ZA BOLESNI KA

**XELJANZ (tofacitinibcitrati)**

*Verzija 6, listopad 2023.*

**U ovoj kartici navedene su važne sigurnosne informacije o lijeku XELJANZ. Ako ne razumijete ove informacije, molimo obratite se liječniku/ljekarniku za savjet.**

- **Ovu karticu nosite sa sobom i pokažite je svakom liječniku ili ljekarniku koji o Vama skrbe, pa i u hitnim situacijama.**
- **Pogledajte uputu o lijeku XELJANZ za više informacija. XELJANZ trebate koristiti sukladno uputi o lijeku.**

**Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o SVIM drugim lijekovima koje uzimate**, uključujući one na recept i bezreceptne lijekove, vitamine i biljne dodatke prehrani.

Uzimanje lijeka XELJANZ s tim lijekovima može povećati Vaš rizik od nuspojava, imunosupresije i infekcije.

Liječenje lijekom XELJANZ može povećati rizik od infekcija, malignih bolesti (uključujući rak pluća, limfom) i nemelanomskog raka kože.

Bolesnici u dobi od 65 godina i stariji mogu imati povećani rizik od infekcija, srčanog udara i nekih vrsta raka. Vaš liječnik može odlučiti da lijek XELJANZ nije prikladan za Vas.

## Odmah se obratite svom liječniku, ako:

- Razvijete iznenadan nedostatak zraka ili imate poteškoće s disanjem, bol u prsnoj koži ili bol u gornjem dijelu leđa, oticanje noge ili ruke, bol ili osjetljivost u nozi, crvenilo ili promjenu boje noge ili ruke dok uzimate lijek XELJANZ, jer to mogu biti znaci krvnog ugruška u plućima ili venama.
- Razvijete simptome infekcije poput vrućice, ustrajnog kašlja, gubitka tjelesne težine ili prekomjernog umora.

- Vam se na koži pojave simptomi herpesa zostera poput bolnog osipa ili mjehura.
- Ste bili u bliskom kontaktu s osobom koja ima tuberkulozu.
- Razvijete jaku bol u prsištu ili stezanje (koje se može proširiti na ruke, čeljust, vrat, leđa), nedostatak zraka, hladan znoj, ošamućenost ili iznenadnu omaglicu jer to mogu biti znakovi srčanog udara.
- Razvijete oticanje limfnih čvorova u vratu, pazusima ili preponama, osjećate stalan umor, vrućicu, noćno znojenje, uporan ili sve jači kašalj, imate poteškoća s

disanjem, promuklošću ili hripanjem ili opazite neobjašnjivo smanjenje tjelesne težine.

- Primijetite bilo kakve nove izrasline na koži ili promjene postojećih madeža ili mrlja na koži.
- Vam se jave bilo kakvi simptomi intersticijske bolesti pluća, poput nedostatka zraka.
- Vam se jave abdominalni znakovi i simptomi poput boli u želucu, boli u trbuhu, krvi u stolici ili bilo kakvi znakovi promjene crijevnih navika praćeni vrućicom.
- Vam koža poprimi žutu boju, osjećate mučninu ili povraćate.

- Razvijete porast imunosupresije kad se koristi u kombinaciji s biološkim lijekovima i imunosupresivima uključujući tvari koje smanjuju broj B-limfocita.
- Primijenjujete Xeljanz u kombinaciji s Metotreksatom (MTX) zbog povećanog rizika od štetnih događaja.

- Trebate primiti bilo koje cjepivo. Tijekom liječenja lijekom XELJANZ ne smijete primiti određene vrste cjepiva.
- Trudni ste ili planirate trudnoću.
- XELJANZ se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće. Žene reproduktivne dobi treba savjetovati da koriste učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom XELJANZ i još najmanje 4 tjedna nakon posljednje doze.
- Žene ne smiju doći dok se liječe lijekom XELJANZ.



## **Ostale informacije (molim popuniti)**

Ime i prezime bolesnika:

Ime i prezime liječnika koji je propisao lijek:

Telefonski broj liječnika koji je propisao lijek:

*Verzija 6, listopad 2023.*

Faks liječničke ordinacije:

**Ako prekinete primjenjivati lijek XELJANZ, ovu karticu nosite sa sobom najmanje 2 mjeseca od primitka zadnje doze lijeka XELJANZ.**

*Verzija 6, listopad 2023.*