

# KEYTRUDA (pembrolizumab)

Može uzrokovati neke ozbiljne nuspojave koje mogu ponekad biti opasne po život i dovesti do smrti. Mogu se javiti bilo kada tijekom liječenja ili čak i nakon što je Vaše liječenje završilo. Možete imati više od jedne nuspojave u isto vrijeme.

Odmah se obratite svom liječniku ako se pojave bilo koji znakovi ili simptomi uključujući i one koji nisu navedeni u ovoj kartici. Vaš liječnik Vam može dati druge lijekove kako bi se spriječile teže komplikacije i smanjili simptomi. Vaš liječnik može odgoditi slijedeću dozu lijeka KEYTRUDA ili prekinuti liječenje lijekom KEYTRUDA.

Za više informacija pročitajte Uputu o lijeku KEYTRUDA, koja sadrži informacije za bolesnika, na adresi: [www.cinmed.me](http://www.cinmed.me)

## VAŽNO

- Nemojte pokušavati sami liječiti nuspojave.
- Nemojte prekinuti liječenje lijekom Keytruda ukoliko o tome niste razgovarali s Vašim liječnikom
- Uvijek nosite ovu karticu sa sobom, osobito kada putujete, kad god odlazite u hitnu službu ili kada morate posjetiti nekog drugog liječnika.
- Obavezno recite svakom zdravstvenom radniku kojeg posjetite da se liječite lijekom KEYTRUDA i pokažite mu ovu karticu.

MK-3475-MNE-PTAC-v3

# Kartica za bolesnika

## Upala pluća

- nedostatak zraka
- bol u prsnom košu
- kašalj

## Upala crijeva

- proljev ili učestalije pražnjenje crijeva nego inače
- crne, katranaste i ljepljive stolice ili stolice koje sadrže krv ili sluz
- jaki bolovi u trbuhu ili osjetljivost trbuha na dodir
- mučnina ili povraćanje

## Upala jetre

- mučnina ili povraćanje
- smanjen osjećaj gladi
- bol s desne strane trbuha
- žuta boja kože ili bjeloočnica
- tamna mokraća
- povećana sklonost krvarenju ili nastanku modrica

## Upala bubrega

- promjene u količini ili boji mokraće

## Upala hormonskih žlijezda

- ubrzani otkucaji srca
- gubitak ili povećanje tjelesne težine
- pojačano znojenje
- gubitak kose
- osjećaj hladnoće
- zatvor
- dublji glas
- bolovi u mišićima
- omaglica ili nesvjestica
- glavobolje koje ne prolaze ili neuobičajena glavobolja

## Šećerna bolest tipa 1, uključujući dijabetičku ketoacidozu

- pojačan osjećaj gladi ili žeđi
- učestalija potreba za mokrenjem
- gubitak tjelesne težine
- umor ili mučnina
- bol u trbuhu
- brzo i duboko disanje
- smetenost
- neuobičajena pospanost
- sladak miris daha
- sladak ili metalni okus u ustima
- drugačiji miris urina ili znoja

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti Izravno Institutu za lijekove i medicinska sredstva putem [www.cinmed.me](http://www.cinmed.me).
- Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## Važni kontaktni podaci

Ime liječnika

Telefonski broj ordinacije

Telefonski broj izvan radnog vremena

Moje ime

Moj telefonski broj

Kontakt za hitne slučajeve (ime i tel. broj)

## Važne informacije za zdravstvene radnike

Ovaj se bolesnik liječi lijekom KEYTRUDA (pembrolizumab), koji može izazvati imunološki uzrokovane nuspojave koje se mogu javiti bilo kada tijekom liječenja ili čak i nakon završetka liječenja. Pregledajte bolesnika kako biste uočili moguće znakove i simptome imunološki uzrokovanih nuspojava. Rano dijagnosticiranje i odgovarajuće zbrinjavanje ključni su u umanjivanju svih posljedica imunološki uzrokovanih nuspojava.

U slučaju sumnje na imunološki uzrokovane nuspojave, potrebno je osigurati odgovarajuću procjenu radi potvrde etiologije ili isključivanja drugih uzroka. Ovisno o težini nuspojave, potrebno je odgoditi primjenu lijeka KEYTRUDA i primijeniti kortikosteroide. Specifične smjernice za zbrinjavanje imunološki uzrokovanih nuspojava nalaze se u Sažetku opisa svojstava lijeka KEYTRUDA.

Savjetovanje s onkologom ili drugim specijalistom može pomoći kod zbrinjavanja imunološki uzrokovanih nuspojava vezanih uz određeni organ.

Za više informacija pročitajte  
Sažetak opisa svojstava lijeka  
KEYTRUDA na stranici  
[www.cinmed.me](http://www.cinmed.me)



MK-3475-MNE-PTAC-v3