



KARTICA ZA PACIJENTA SA UPOZORENJIMA

Pradaxa®, kapsule, tvrde
dabigatraneteksilat

- Vi / negovatelj treba da nosite ovu karticu sa upozorenjima uvek sa sobom
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju

Mart, 2024.



Boehringer
Ingelheim

Poštovani pacijentu / negovatelju
pedijatrijskog pacijenta,

Vaš lekar / lekar Vašeg deteta je započeo lečenje lekom Pradaxa®. Molimo Vas da u cilju bezbedne primene leka Pradaxa® razmotrite važne informacije u Uputstvu za lek.

S obzirom da ova Kartica za pacijenta sa upozorenjima sadrži važne informacije o Vašem lečenju / lečenju Vašeg deteta, molimo da je Vi / Vaše dete nosite sa sobom u svim prilikama kako biste obavestili zdravstveno osoblje da Vi / Vaše dete uzimate lek Pradaxa®.



Informacija za pacijente / negovatelje pedijatrijskih pacijenata o leku Pradaxa®

O Vašoj terapiji / terapiji Vašeg deteta

- Pradaxa® razređuje krv. Koristi se za terapiju postojećih krvnih ugrušaka ili za sprečavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Uzimajte lek Pradaxa® prema uputstvu Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta. Nikada ne propuštajte dozu i ne prekidajte uzimanje leka Pradaxa® bez savetovanja sa Vašim lekarom / lekarom Vašeg deteta.
- Obavestite Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta o svim lekovima koje Vi / Vaše dete trenutno uzimate.
- Obavestite Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta da uzimate lek Pradaxa® pre svakog hirurškog ili invazivnog zahvata.
- Pradaxa® se može uzimati sa ili bez hrane. Kapsula treba da se proguta cela, sa čašom vode. Ne lomite, ne žvaćite i ne praznite pelete iz kapsule.

Kada potražiti savet lekara

- Uzimanje leka Pradaxa® može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite Vašem lekaru / lekaru Vašeg deteta ako kod Vas / Vašeg deteta primetite bilo koji od sledećih znakova i simptoma krvarenja: oticanje, nelagodnost, neobičan bol ili glavobolju, vrtoglavicu, bledilo, slabost, neobične modrice, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, neobično dugotrajno krvarenje iz posekotina, neuobičajeno menstrualno ili vaginalno krvarenje, krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanje krvi, povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu kafe.
- Ukoliko padnete ili se povredite tokom uzimanja leka, posebno ako udarite glavu, molimo odmah potražite medicinsku pomoć.
- Ne prekidajte uzimanje leka Pradaxa® bez savetovanja sa Vašim lekarom/lekarom Vašeg deteta ako Vi / Vaše dete osetite gorušicu, mučninu, povraćate, osećate nelagodnost u želucu, nadutost ili bol u gornjem delu trbuha.

Informacije za zdravstvene radnike u vezi leka Pradaxa®

- Pradaxa® je oralni antikoagulans koji deluje putem direktnе inhibicije trombina.
- Primena leka Pradaxa® možda će se morati privremeno prekinuti pre hirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- U slučaju velikog krvarenja primena leka Pradaxa® se mora odmah obustaviti.
- Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle pacijente. Nije ustanovljena efikasnost i bezbednost specifičnog antagoniste idarucizumaba kod pedijatrijskih pacijenata. Za detalje i više saveta o poništavanju antikoagulantnog dejstva leka Pradaxa® videti Sažetke karakteristika leka za lek Pradaxa® i idarucizumab.
- S obzirom da se Pradaxa® uglavnom eliminiše putem bubrega, potrebno je održavati odgovarajuću diurezu. Pradaxa® se može ukloniti dijalizom.

**Molimo Vas da popunite ovaj deo ili zamolite
Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta da to učini.**

Informacija o pacijentu

(Ime pacijenta)

(Datum rođenja)

(Indikacija za antikoagulantnu terapiju)

(Doziranje leka Pradaxa®)