

Važne nuspojave



Ovaj lijek može utjecati na funkciju Vaše jetre, krvni tlak te na određene krvne stanice koje su važne za borbu protiv infekcija.

Ako imate bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah se obratite svom liječniku:

- Žuta boja kože ili bjeloočnica, tamna mokraća, mučnina ili povraćanje i bol u trbuhu. U ovom slučaju mogli biste imati problem s jetrom.
- Visoka temperatura (vrućica), kašalj, zimica, natečene žlijezde, smanjeno ili bolno mokrenje. U ovom slučaju mogli biste imati infekciju.



Za žene u reproduktivnoj dobi, uključujući djevojčice i njihove roditelje/skrbnike

- Nemojte započeti liječenje lijekom koji sadrži teriflunomid ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni. Vaš liječnik će od Vas možda zatražiti da napravite test na trudnoću kako biste provjerili mogućnost trudnoće.
- Koristite učinkovite mjere kontracepcije tijekom i nakon liječenja lijekom koji sadrži teriflunomid. Vaš će Vas liječnik savjetovati o potencijalnim rizicima za plod te o potrebi za učinkovitom kontracepcijom.
- Obratite se svom liječniku ako želite promijeniti metodu kontracepcije ili ako želite zatrudnjeti.
- Ako zatrudnite ili mislite da ste trudni prestanite primjenjivati teriflunomid te se **odmah obratite svom liječniku.**
- U slučaju trudnoće, Vaš liječnik može preporučiti terapiju određenim lijekovima kako bi se ubrzalo uklanjanje teriflunomida iz Vašeg tijela.
- Također biste trebali razgovarati s Vašim liječnikom ako dojite ili planirate dojeti.
- Za roditelje/skrbnike ili djevojčice: molimo obratite se Vašem liječniku kada bolesnica dobije prvu mjesječnicu radi savjetovanja o potencijalnom riziku za plod i potrebi za kontracepcijom.