

## **Informacije o lijeku Tresiba® (insulin degludek)**

(insulin degludek, rastvor za injekciju, proizveden tehnologijom rekombinantne DNK)

**Razumjevanje formulacije i jačine lijeka koji Vam je propisao Vaš ljekar**

## Šta je Tresiba® i za šta se koristi

Lijek Tresiba® je bazalni analog insulina. Koristi se za liječenje dijabetes melitus-a kod odraslih, adolescenata i djece od 1 godine starosti.<sup>1</sup> On pomaže Vašem organizmu da smanji nivo šećera u krvi. Tresiba® se koristi jednom dnevno. U slučajevima kada se ne možete pridržavati svog uobičajenog rasporeda uzimanja lijeka, možete promijeniti vrijeme uzimanja lijeka. Postarajte se da vremenski razmak između doza bude najmanje 8 časova.

### Dvije različite jačine lijeka Tresiba®

Lijek Tresiba® je dostupan u dvije jačine: 100 jedinica/mL i 200 jedinica/mL. Tresiba® 200 jedinica/mL FlexTouch® pen ima dvostruko više jedinica insulina u svakom mL. Vaš ljekar će Vam propisati jačinu lijeka koja je za Vas odgovarajuća.

Oba pena za davanje insulina imaju brojač doza koji pokazuje tačan broj odabranih doza.

To znači da će doza koja se prikazuje na brojaču doza biti ubrizgana bez obzira na jačinu lijeka. Uvijek koristite brojač i pokazivač doza kako biste odabrali potrebnu dozu lijeka. Ne brojite klikove. Ne treba vršiti konverziju doze u slučaju da prelazite sa jedne na drugu jačinu lijeka. Prije ubrizgavanja lijeka Tresiba® provjerite koliko je jedinica odabrano.

Tresiba®  
Jačina 100 jedinica/mL  
Maksimalna doza po injekciji 80 jedinica

svjetlozelena

Tresiba®  
Jačina 200 jedinica/mL  
Maksimalna doza po injekciji 160 jedinica

tamnozelena



Sadrži 300 jedinica insulina u 3 mL



Sadrži 600 jedinica insulina u 3 mL


### Kako da prepoznate jačinu lijeka koja Vam je propisana

Važno je da budete sigurni u to da koristite ispravnu jačinu lijeka koju Vam je propisao Vaš ljekar. „Tresiba® 100 jedinica/mL“ ili „Tresiba® 200 jedinica/mL“ su jasno naznačeni na naljepnici i spoljašnjem pakovanju.

Osim toga, pakovanje i naljepnica lijeka Tresiba® 100 jedinica/mL su svjetlozelene boje, a pakovanje i naljepnica lijeka Tresiba® 200 jedinica/mL su tamnozelene boje sa prugama. Najlepnicu i pakovanje lijeka Tresiba® 200 jedinica/mL takođe sadrže crveno polje u kome je naznačena jačina lijeka.

Pakovanje lijeka Tresiba®  
100 jedinica/mL  
5 penova u kartonskoj kutiji

Pakovanje lijeka Tresiba®  
200 jedinica/mL  
3 pena u kartonskoj kutiji



Ukoliko ste daltonista (ne razlikujete boje),  
lijek Tresiba® 200 jedinica/mL takođe možete prepoznati po  
dvijema izbočenim tačkama na dugmetu za ubrizgavanje doze.

## Kako izbjeći zabunu

Ukoliko ste slijepi ili slabovidni i niste u mogućnosti da očitajte brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj pen bez pomoći. Neka Vam pomogne osoba sa dobrim vidom koja je obučena za upotrebu lijeka Tresiba®.

Uvijek provjerite naljepnicu na insulinu prilikom preuzimanja lijeka u apoteci, kao i prije svakog ubrizgavanja, kako biste izbjegli da slučajno pomiješate dvije različite jačine lijeka Tresiba® i ostale insulinske preparate koje eventualno uzimate.

Upotreba pogrešne jačine insulina ili pogrešnog lijeka mogla bi potencijalno da dovede do toga da uzmete previše ili premalo insulina. Prevelika količina insulina može dovesti do hipoglikemije, odnosno suviše niskog nivoa šećera u krvi. Za više informacija, obratite se svom ljekaru.

Molimo Vas da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka Tresiba® FlexTouch® prijavite Odjeljenju za farmakovigilancu CInMED, popunjavanjem obrasca za prijavljivanje neželjenih reakcija na lijekove, koji možete naći na [www.cinmed.me](http://www.cinmed.me) i poslati na jedan od sljedećih načina:

-Poštom na adresu:

Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore

Bulevar Ivana Crnojevića 64A

81000 Podgorica

- Telefonom: + 382 (20) 310 280

- Faksom: + 382 (20) 310 581

- Elektronskom poštom na adresu: [nezeljenadejstva@cinmed.me](mailto:nezeljenadejstva@cinmed.me)

Sumnja na neželjeno dejstvo lijeka može se prijaviti CInMED i preko forme za online prijavu kojoj možete pristupiti klikom ili skeniranjem QR koda ispod.



Dodatno, sumnju na neželjeno dejstvo lijeka Tresiba® FlexTouch® možete prijaviti i nosiocu dozvole za lijek u Crnoj Gori:

Novo Nordisk Pharma Operations A/S, Danska – predstavništvo Crna Gora

Kritskog odreda br. 4/1 81000 Podgorica

tel: +382 20 223 128

e-mail: [NNSCGSafety@novonordisk.com](mailto:NNSCGSafety@novonordisk.com)

## Lijek Tresiba® ne smiju da koriste

- osobe koje su alergične na insulin degludek ili na neki od ostalih sastojaka lijeka Tresiba®

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Pridržavajte se svih instrukcija navedenih u uputstvu za lijek koje se nalazi u pakovanju. Ukoliko Vam je potrebna pomoć, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Referenca: 1. Sažetak karakteristika lijeka za lijek Tresiba® FlexTouch® 100 jedinica/mL i Tresiba® FlexTouch® 200 jedinica/mL, mart 2023.

Verzija 3.0

Datum odobrenja: jul 2024. godine



Novo Nordisk Pharma Operations A/S Danska, Predstavništvo Crna Gora  
SM24TSM00007