

Kartica-podsetnik za pacijenta

Inflectra

100 mg prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

infliksimab

Kartica-podsetnik za pacijenta

Pokažite ovu karticu svakom lekaru koji je uključen u Vaše lečenje.

Ova kartica-podsetnik za pacijenta sadrži važne informacije o bezbednosti, koje morate znati pre i tokom lečenja lekom Inflectra.

Ime pacijenta:

Ime lekara:

Telefon lekara:

Kada otvorite novu karticu, molimo Vas da i ovu karticu čuvate kao izveštaj, sve do isteka 4 meseca nakon primanja poslednje doze leka Inflectra.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uputstvo za lek Inflectra pre nego što počnete sa primenom ovog leka.

Datum početka terapije lekom Inflectra:

Trenutni režim primene leka:

Važno je da Vi i Vaš lekar zabeležite zaštićeno ime i broj serije primenjenog leka.

Zaštićeno ime:

Broj serije:

Zamolite Vašeg lekara da ovde upiše vrstu i datum poslednjeg(ih) testa(testova) na tuberkulozu:

Test

Test

Datum

Datum

Rezultat:

Rezultat:

Molimo Vas da prilikom svake posete lekaru sa sobom ponesete spisak svih drugih lekova koje koristite.

Spisak alergija:

Spisak drugih lekova:

Infekcije

Šta da radite pre početka terapije lekom Inflectra

- Obavestite Vašeg lekara ako imate neku, čak i najmanju infekciju.
- Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ukoliko ste ikada bolovali od tuberkuloze (TBC) ili ukoliko ste bili u bliskom kontaktu sa osobom koja je bolovala od TBC. Vaš lekar će Vas testirati da bi utvrdio da li imate TBC. Zamolite Vašeg lekara da u ovu karticu upiše vrstu i datum Vašeg(ih) poslednjeg(ih) testa(testova) na TBC.

- Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate hepatitis B ili ukoliko znate ili sumnjate da ste nosilac virusa hepatitisa B.

Šta da radite tokom terapije lekom Inflectra

- Odmah obavestite Vašeg lekara ako imate znake infekcije. Ovi znaci uključuju povišenu telesnu temperaturu, zamor, (uporan) kašalj, kratak dah, gubitak telesne mase, noćno znojenje, dijareju (proliv), rane, probleme sa zubima, osećaj pečenja tokom mokrenja ili simptome slične gripu.

Trudnoća, dojenje i vakcinacija

- Ukoliko ste tokom trudnoće primali lek Inflectra ili ukoliko dojite, važno je da o tome obavestite lekara Vaše bebe, pre nego što Vaša beba primi bilo koju vakcinu. Vaša beba ne sme da primi živu vakcinu kao što je npr. BCG (koja se primenjuje za prevenciju tuberkuloze) u periodu od 12 meseci nakon rođenja ili tokom dojenja, osim ukoliko Vaš lekar ne preporuči drugačije.

Ovu karticu treba da nosite sa sobom 4 meseca nakon primanja poslednje doze leka Inflectra, ili u slučaju trudnoće 12 meseci nakon rođenja bebe. Neželjene reakcije mogu da se pojave i dugo vremena nakon poslednje doze leka.