



Sumnju na neželjeno dejstvo lijek Aubagio možete da prijavite i nosiocu dozvole u Crnoj Gori: AMICUS PHARMA d.o.o. Podgorica, Džordža Vasiingtona 51, 81 000 Podgorica
 Telefon: 020 436 800, E-mail: medinfo.montenegro@swixxbiopharma.com

klikom ili skeniranjem QR koda ispod.

- pomoću aplikacije za online prijavu, kojoj se pristupa preko portala ClinMED www.clinmed.me ili kojoj možete pristupiti putem informacionog sistema zdravstvene zaštite (ukoliko Vam je dostupna aplikacija za prijavljivanje neželjenih dejstava);

Sumnju na neželjeno dejstvo lijeka možete prijaviti:

- putem elektronskom putem na adresu nezelenadejstva@clinmed.me
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.clinmed.me i slanjem putem:

• ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.clinmed.me

Molimo Vas da svaku sumnju na neželjenu reakciju lijeka prijavite Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CinMED)

Kontakt telefon lekara: _____

Ime i prezime lekara: _____

Naziv zdravstvene ustanove: _____

Datum prvog propisivanja leka Aubagio: _____

Ime i prezime pacijenta: _____

KARTICA ZA PACIJENTA

Ova Kartica za pacijenta sadrži važne bezbednosne informacije koje treba da znate ukoliko ste na terapiji lekom Aubagio®. Za kompletne informacije pogledajte Uputstvo za lek.



Opšte uputstvo

Molimo Vas da ovu Karticu pokažete svakom lekaru ili zdravstvenom radniku koji je uključen u Vaše medicinsko zbrinjavanje (npr. u hitnim stanjima).



Važna neželjena dejstva

Ovaj lek može uticati na funkciju Vaše jetre, Vaš krvni pritisak kao i na određene ćelije krvi koje su važne za odbranu od infekcija.

U slučaju pojave bilo kog od navedenih neželjenih dejstava, odmah se obratite lekaru.

- Žuta prebojenost kože ili beonjača, tamniji urin, mučnina ili povraćanje i bol u trbuhu. U tom slučaju, možda imate problema sa jetrom.
- Visoka telesna temperatura (groznica), kašalj, drhtavica, otečene žlezde, otežano ili bolno mokrenje ili konfuzija. U tom slučaju, možda imate neku infekciju.



Za žene u reproduktivnom periodu, uključujući devojčice i njihove roditelje/staratelje

- Ukoliko ste trudni ili sumnjate da ste trudni ne počinjte terapiju lekom Aubagio. Vaš lekar može zatražiti da uradite test na trudnoću kako biste bili sigurni.
- Koristite pouzdanu kontracepciju tokom primene leka Aubagio. Vaš lekar će Vas posavetovati o potencijalnim rizicima za fetus i o potrebi za efikasnom kontracepcijom.
- Obratite se svom lekaru ako želite da promenite metodu kontracepcije ili ako želite da zatrudnite.
- Ako ostanete u drugom stanju ili mislite da ste trudni, prekinite sa uzimanjem teriflunomida i **odmah se obratite svom lekaru.**
- U slučaju trudnoće, Vaš lekar može da preporuči terapiju lekovima koji omogućavaju brzu eliminaciju leka teriflunomida iz Vašeg organizma.
- Takođe treba da razgovarate sa Vašim lekarom ukoliko dojite ili planirate da dojite.
- Za roditelje/staratelje ili devojčice: molimo Vas da se obratite lekaru kada pacijentkinja dobije prvu menstruaciju, kako biste dobili savete o potencijalnom riziku za fetus i potrebi za kontracepcijom.