



Mayzent (siponimod)

Informacije za pacijentkinje u reproduktivnom periodu

Verzija 2, februar 2026.

Sadržaj

Pre nego što počnete da uzimate lek Mayzent	3
Dok uzimate lek Mayzent	4
Nakon što prestanete da uzimate lek Mayzent	6


Pre nego što počnete da uzimate lek Mayzent



Lek Mayzent ne sme da se koristi kod trudnica, niti kod žena u reproduktivnom periodu (koje mogu da zatrudne), a koje ne koriste efikasnu metodu kontracepcije.



Žena u reproduktivnom periodu mora da ima negativan test na trudnoću, kao i da koristi efikasnu metodu kontracepcije pre početka lečenja. Testiranje na trudnoću se mora ponavljati u odgovarajućim intervalima.



Razgovarajte sa svojim lekarom o pouzdanim metodama kontracepcije koje morate da koristite za vreme lečenja i najmanje 10 dana nakon što ste prekinuli lečenje lekom Mayzent.

Molimo Vas da pročitate uputstvo za lek Mayzent koje se nalazi u pakovanju Vašeg leka.

Dok uzimate lek Mayzent



Dok uzimate lek Mayzent **ne smete da ostanete u drugom stanju.**

Za vreme lečenja morate da koristite efikasne medote kontracepcije, kao i najmanje 10 dana nakon što ste prekinuli lečenje.

Vaš lekar će Vas informisati pre početka lečenja, kao i redovno tokom lečenja, o mogućim rizicima za fetus koje lek Mayzent može da izazove.



Ukoliko planirate trudnoću, ili ste ostali u drugom stanju, molimo Vas da razgovarate sa svojim lekarom o prekidu lečenja lekom Mayzent kao i mogućem povratku bolesti u aktivnu formu nakon prestanka lečenja.

Molimo Vas da odmah obavestite svog lekara ako ostanete u drugom stanju, ili mislite da ste trudni, tokom lečenja lekom Mayzent pošto lečenje mora da bude prekinuto.

Vaš lekar će Vam objasniti da postoji mogućnost povratka bolesti u aktivnu formu nakon prestanka lečenja.



Ako do trudnoće dođe u toku lečenja lekom Mayzent, Vaš lekar može da Vam savetuje kontrolne lekarske preglede (npr. pregled ultrazvukom).



Kompanija Novartis je uvela program Intenzivni monitoring ishoda trudnoće (*PR*egnancy *o*utcomes *I*ntensive *M*onitoring - PRIM), u cilju prikupljanja informacija o trudnoći kod pacijentkinja koje su bile izložene leku Mayzent neposredno pre ili u toku trudnoće, kao i o ishodima kod beba 12 meseci posle porođaja.

Ako do trudnoće dođe tokom lečenja lekom Mayzent, molimo Vas da o tome odmah obavestite svog lekara, koji će Vas podstaći da se registrujete u PRIM program.

Nakon što prestanete da uzimate lek Mayzent



Morate da koristite efikasne metode kontracepcije tokom još najmanje 10 dana nakon što prestanete da uzimate lek Mayzent.

Ako do trudnoće dođe u periodu od 10 dana nakon prekida lečenja, molimo Vas da o tome odmah obavestite svog lekara, bez obzira na ishod.

- Kompanija Novartis je uvela program Intenzivni monitoring ishoda trudnoće (*PR*egnancy outcomes *I*ntensive *M*onitoring - PRIM), u cilju prikupljanja informacija o trudnoći kod pacijentkinja koje su bile izložene leku Mayzent neposredno pre ili u toku trudnoće, kao i o ishodima kod beba 12 meseci posle porođaja.



Nakon prestanka lečenja lekom Mayzent, ako smatrate da se stanje Vaše bolesti pogoršalo (npr. slabost ili poremećaji vida) ili ako primetite bilo koje nove simptome, odmah o tome obavestite svog lekara.

Kontakt podaci Vašeg lekara

Za dodatne informacije molimo Vas da pročitate Uputstvo za lek priloženo u svakom pakovanju leka.

Sačuvate ovaj podsetnik. Možda Vam zatreba da ga ponovo pročitate.

