

Kartica sa upozorenjima za pacijenta

Označite propisanu dozu

- Trombocen[®] 2,5 mg

☐
- Trombocen[®] 10 mg

☐
- Trombocen[®] 15 mg

☐
- Trombocen[®] 20 mg

☐

- Ovu karticu stalno imajte kod sebe.
- Pokažite ovu karticu svakom ljekaru ili stomatologu prije započinjanja liječenja ili bilo kakve intervencije.

PRIMAM antikoagulantnu terapiju lijekom Trombocen (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Težina:

Drugi lijekovi /stanja:

U hitnom slučaju obavjestite:

Ime ljekara:

Telefon ljekara:

Pečat ljekara:

Podaci o pacijentima (lični podaci pacijenata) nisu dostupni kompaniji HEMOFARM AD VRŠAC.

Takođe obavjestite:

Ime i prezime:

Telefon:

Srodstvo:

1375577 ME

Informacija za zdravstvene radnike:

INR vrijednosti ne treba da se koriste jer nisu pouzdan pokazatelj antikoagulantne aktivnosti lijeka Trombocen.

Šta treba da znam o lijeku Trombocen?

- Lijek Trombocen razrjeđuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Lijek Trombocen morate uzimati tačno onako kako Vam je propisao ljekar. Da bi se obezbijedila optimalna zaštita od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad ne preskačite dozu.**
- Ne smijete da prestanete sa uzimanjem lijeka Trombocen, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim ljekarom, pošto Vam se može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavijestite svog ljekara o svakom drugom lijeku koji trenutno uzimate, koji ste do nedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, prije nego što počnete da uzimate Lijek Trombocen.
- Obavijestite svog ljekara o tome da uzimate lijek Trombocen prije bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savjet svog ljekara?

Kada uzimate lijek koji razrjeđuje krv, kao što je lijek Trombocen, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo.

Nemojte počinjati sa uzimanjem lijeka Trombocen ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o tome ne porazgovarate sa svojim ljekarom.

Odmah kažite svom zdravstvenom radniku ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su:

- Bol
- Otok ili nelagodnost
- Glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- Neuobičajena pojava modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja iz desni, krvarenja iz posjekotina kojima treba mnogo vremena da prestanu
- Menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično
- Krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica
- Iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe.

Kako da uzimam Lijek Trombocen?

Da bi se obezbijedila optimalna zaštita:

- Lijek Trombocen, 2,5 mg se može uzimati uz obrok ili nezavisno od njega.
- Lijek Trombocen, 10 mg se može uzimati uz obrok ili nezavisno od njega.
- Lijek Trombocen, 15 mg se mora uzimati uz obrok.
- Lijek Trombocen, 20 mg se mora uzimati uz obrok.