Kartica za pacijenta

TROMBOMELT (apiksaban)

- Ovu karticu uvijek nosite sa sobom.
- Pokažite ovu karticu svom farmaceutu, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku koji Vas liječi.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Trombomelt (apiksaban) koji sprečava zgrušavanje krvi.

Ime i prezime:
Datum rođenja:
Indikacija:
Doza: _____mg dvaput dnevno

Ime i prezime ljekara:
Telefon ljekara:

Informacije za zdravstvene radnike

- Trombomelt (apiksaban) je oralni antikoagulans koji djeluje direktnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- Trombomelt može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Terapija lijekom Trombomelt ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrisano kvantitativno određivanje sadržaja antifaktora Xa može biti korisno u izuzetnim situacijama, kao na primjer kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PT), internacionalni normalizovani odnos (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTT) se ne preporučuju) — vidjeti *Sažetak karakteristika lijeka*.

Informacije za pacijente

- Trombomelt uzimajte redovno, prema uputstvu. Ako propustite jednu dozu, uzmite je čim se sjetite i nastavite prema uobičajenom rasporedu uzimanja.
- Nemojte prestati uzimati Trombomelt bez razgovora sa ljekarom, s obzirom na to da imate rizik od moždanog udara ili drugih komplikacija.
- Trombomelt pomaže da se razrijedi krv. Međutim, to Vam može povećati rizik od krvarenja.
- Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, vrtoglavicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- Ako idete na operaciju, obavijestite svog ljekara da uzimate Trombomelt.