

## KARTICA SA UPOZORENJIMA ZA PACIJENTA

BEREVIN<sup>®</sup>, kapsule, tvrde  
dabigatraneteksilat

- Vi / negovatelj morate u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom.
- Uverite se da koristite najnoviju verziju.

[xxxx 20xx]

### Poštovani pacijentu / negovatelju pedijatrijskog pacijenta,

Vaš lekar / lekar Vašeg deteta započeo je lečenje lekom BEREVIN. Da bi primena leka BEREVIN bila bezbedna, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se nalaze u Uputstvu za lek.

S obzirom da ova Kartica sa upozorenjima za pacijenta sadrži važne informacije o Vašem lečenju / lečenju Vašeg deteta, ona mora uvek biti sa Vama / Vašim detetom kako biste Vi / Vaše dete mogli obavestiti zdravstvene radnike da primenjujete lek BEREVIN.

### BEREVIN Informacije za pacijente / negovatelje pedijatrijskih pacijenata

O Vašem lečenju / lečenju Vašeg deteta

- Lek BEREVIN razređuje krv. Koristi se za lečenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprečavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Pratite uputstva Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta tokom primene leka BEREVIN. Nikad nemojte da preskočite dozu niti da prekinete sa uzimanjem leka BEREVIN bez savetovanja sa Vašim lekarom / lekarom Vašeg deteta.
- Obavestite Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta o svim lekovima koje Vi / Vaše dete trenutno uzimate.
- Obavestite Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta o uzimanju leka BEREVIN pre svake operacije / invazivne procedure.
- Lek BEREVIN, kapsule se mogu uzimati sa hranom ili bez nje. Kapsulu je potrebno progutati celu sa čašom vode. Kapsule se ne smeju lomiti ili žvakati i pelete se ne smeju prazniti iz kapsule.

Kada potražiti savet lekara

- Uzimanje leka BEREVIN može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite Vašem lekaru / lekaru Vašeg deteta ako se kod Vas / Vašeg deteta jave znaci i simptomi krvarenja kao što su: oticanje, nelagodnost, neuobičajan bol ili glavobolja, vrtoglavica, bledilo, slabost, neuobičajene modrice, krvarenje iz nosa, krvarenje desni, neuobičajeno dugotrajno krvarenje iz posekotina, abnormalno menstrualno ili vaginalno krvarenje, krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena/crna stolica, iskašljavanje krvi, povraćanje krvi ili sadržaja koji liči na talog kafe.
- U slučaju pada ili povrede, naročito udarca u glavu, hitno potražite savet lekara.
- Ne prekidaajte sa uzimanjem leka BEREVIN bez savetovanja sa Vašim lekarom / lekarom Vašeg deteta ako Vi / Vaše dete osetite gorušicu, mučninu, povraćate, imate nelagodnost u stomaku, nadutost ili bol u gornjem delu stomaka.

### BEREVIN Informacije za zdravstvene radnike

- Lek BEREVIN je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).
- Primena leka BEREVIN se možda mora prekinuti pre operacije ili druge invazivne procedure.
- U slučaju obilnih krvarenja, primena leka BEREVIN se mora odmah prekinuti.

- Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle pacijente. Nije ustanovljena efikasnost i bezbednost specifičnog antagoniste idarucizumaba kod pedijatrijskih pacijenata. Za detalje i više saveta o antagonizujućem efektu antikoagulacionog dejstva leka BEREVIN videti Sažetak karakteristika leka za lek BEREVIN i idarucizumab.
- S obzirom na to da se lek BEREVIN uglavnom eliminiše putem bubrega, mora se održavati odgovarajuća diureza. Lek BEREVIN se može ukloniti dijalizom.

**Molimo Vas da popunite ovaj odeljak ili zamolite Vašeg lekara / lekara Vašeg deteta da to uradi.**

**Podaci o pacijentu**

---

Ime pacijenta

---

Datum rođenja

---

Indikacija za antikoagulantnu terapiju

---

Doza leka BEREVIN